

Diéthion

Synonyme : Éthion (1961)


Famille : Organo-phosphorés

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

Grandes cultures	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<i>Betterave</i>	1961	1990		X	X	Parathion-éthyl
<i>Céréales</i>	1997	2002			X	Endosulfan
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>	1961	2001	Pommier	X	X	Dicofol Azinphos-méthyl Parathion éthyl
<i>A noyaux</i>	1961	1993		X	X	Dicofol
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	1961	2007	Carotte, céleri, persil, choux, poireau, oignon...	X	X	Dicofol
Cultures ornementales	1964	1994		X	X	Dicofoll Parathion éthyl
Cultures tropicales						
Viticulture	1961	2002		X	X	***
Cultures diverses						
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences	1964	2002	Haricot, céréales, oignon	X	X	Oxyquinoléate de cuivre Anthraquinone
Traitement de sols	1966	2007	Carotte, céleri, persil, poireau, oignon, échalote	X		
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2007) :

- action : contact
- solubilité dans l'eau : pratiquement insoluble 2 mg/l
- spectre : pucerons
- persistance d'action : 3 à 4 semaines

Toxicité (2007) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R21/25 T DL50 rat ingestion : 208 mg/kg	DJA : 0.002 mg/kg/jour					
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Rhodocide (1959)

Évolution de formulation : LP