

Dibrométhane

Synonyme : Dibromure d'éthylène


Famille : Halogènes

Groupe : Nématicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières						
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture						
Cultures diverses						
Traitements généraux						

DIBROMÉTHANE
19/03/2013

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols	1961	1984	Viticulture, cultures légumières	X	X	Dichloropropène
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (1984) :

- action : par vapeur
- solubilité dans l'eau : 4300 ppm
- spectre : Nématodes
- persistance d'action : -

Toxicité (1984) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		Tableau C (sauf pour les concentrations <=5%) DL50 rat par ingestion : 146 mg/kg						
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Kuhlmann DB 50 (1953)

Évolution de formulation : -